

**55, rue Mazenod - 69426 LYON CÉDEX 03 - ☎ 78.95.48.48**

25 Juin 1987

N° de série continue 153

Bulletin n° 19

**ARBORICULTEURS : RESPECTEZ LES DELAIS D'EMPLOI DES PRODUITS AVANT RECOLTE**

**PECHER** : Tordeuse Orientale - Protégez les fruits selon la date de récolte  
Puceron d'été - Surveillez-les  
**PRUNIER** : Carpocapse, Rouille - Renouvelez la protection  
**POIRIER - POMMIER** : Tavelures - Bientôt la fin des contaminations primaires  
**VIGNE** : Mildiou, Oïdium, Black-rot - Poursuivez la protection  
Acaris jaunes - Surveillez-les.  
P4 : tableau des produits utilisables contre les Acariens de la vigne

## ARBRES FRUITIERS

### ABRICOTIER

**PETITE MINEUSE (ANARSIA)** - Poursuivez la protection

Le 1er vol se poursuit. Sur variétés semi-tardives type Polonais, Bergeron, prévoyez le renouvellement du traitement au bout d'une douzaine de jours environ. Seuls les vergers régulièrement atteints sont concernés.

**MALADIES DE CONSERVATION (MONILIA)** - Protection en fonction des risques

Temps humide et orageux. Inoculum important du verger.

### CERISIER

**ANTHRACNOSE** - Surveillez vos vergers après la récolte

### PECHER

**TORDEUSE ORIENTALE** - Protégez les fruits selon la date de récolte

Le 2ème vol ne devrait pas tarder de commencer.

- **Variétés précoces** (récolte avant le 5 Juillet, type Springcrest) : **pas de traitement**
- **Variétés semi-précoces** (Dixired) : **1 traitement** 15 jours avant récolte (R - 15)  
Une variété dont le début de cueille est prévue le 15 Juillet sera traitée le 1er Juillet
- **Variété de saison** (Redhaven, Red top...) : **2 traitements** (R - 27 j et R - 15 j)  
Une variété dont le début de cueille est prévue le 25 Juillet sera traitée le 28 Juin et le 10 Juillet
- **Variétés tardives** (Fantasia, M. Franciscan...) : **3 traitements** (R - 39 j ; R - 27 j et R - 15 j)  
Une variété dont le début de cueille est prévu le 11 août sera traitée les 4 - 16 et 28 Juillet

**Produits homologués ou en autorisation provisoire de vente (g ma/hl)**  
(nombre de jours : délai d'emploi avant récolte)

*azinphos éthyl et méthyl : 40 (nb spéc) (15 jours)	fluvalinate : 14,4 (KLARTAN) (7 jours)
*carbaryl : 120 (SEVIN L 85) (7 jours)	*méthidathion : 40 (ULTRACIDE 20 BOUILLIE) (15 jours)
deltaméthrine : 1,75 (DECIS, DECIS FLOW)	méthomyl : 75 (LANNATE 20 L) (7 jours)
dichlorvos : 125 (nb spéc) (5 jours)	mévinphos : 50 (PHOSDRIN W 10, PHOSLIT 10, MEVINTOX) (7 jours)
*fénitrothion : 50 (nb spéc) (15 Jours)	*parathion éthyl et méthyl : 25 (nb spéc) (15 jours)
*fenvalérate : 7,5 (SUMICIDIN 10) (21 jours)	phosalone : 60 (AZOPHENE, ZOLONE) (15 jours)
fenpropathrin : 10 (DANITOL) (15 jours)	

7286



### Associations

- \*azinphos + déméton S méthyl sulfone (GUSATHION MS) (21 jours)
- \*carbaryl + lindane (NAFTILO) (15 jours)
- dicofol + azinphos éthyl (TAXENE) (15 jours)
- dicofol + parathion méthyl (KELTHANE MIXTE) (15 jours)
- fenvalérate + fénitrothion (SUMICOMBI) (15 jours)
- \*parathion éthyl + lindane (SOPRAGAM, TYPHOLINE GAMMA 50) (15 jours)
- \*phosalone + parathion méthyl (TAXYLONE) (15 jours)

\*favorise souvent les acariens rouges.

Phosalone et fluvalinate présentent la moindre toxicité sur les insectes utiles.

Fenpropathrin est également acaricide à 20 g ma/hl.

Dichlorvos et Mévinphos ont une action très fugace : ne les utilisez que si un traitement est nécessaire à moins de 15 jours de la récolte.

**Ne laissez pas passer plus de 10-12 jours entre 2 traitements.**

Cette règle est absolument impérative dans les vergers où la Tordeuse Orientale a posé des problèmes en 1986.

Pensez à renouveler votre protection après lessivage (pluie ou irrigation).

**En jeune verger en formation où les attaques sur pousses sont dommageables,** reprenez la protection des pousses à partir de début Juillet.

### FORFICULES - Ne traitez que les vergers habituellement attaqués

De préférence la nuit avec naled à 100 g ma/hl (ORTHO-DIBROM, PYOMIX), interdit 7 jours avant la récolte.

### PUCERONS D'ETE : BRUN, FARINEUX - Reconnaissiez-les

Le puceron brun se reconnaît par sa pigmentation dorsale qui s'interrompt latéralement au niveau de chaque segment ; le ventre est vert. Les larves sont brun-verdâtre. **Surveillez vos jeunes plantations.**

Le Puceron farineux : vert pâle, glauque recouvert d'une cire blanchâtre, sécrète un miellat abondant.

Des produits type phosalone suffisent à limiter le puceron brun.

Par contre, les infestations de pucerons farineux nécessitent une intervention avec un aphicide spécifique.

### TAVELURE - Poursuivez la protection des vergers habituellement atteints

### MALADIES DE CONSERVATION - Protection en fonction des risques

Temps humide, irrigation par dessous, inoculum au verger.

#### PRUNIER

**CARPOCAPSE, ROUILLE - 2ème traitement dès réception en toute situation**

#### POIRIER

### PSYLLES - Evitez les produits dangereux sur punaises prédatrices

Les matières actives suivantes sont réputées toxiques ou très toxiques sur anthocorides.

Insecticides :

acéphate (ORTHENE 50)	malathion (nb spéc)	perméthrine (AMBUSH)
azinphos (nb spéc)	méthidathion (ULTRACIDE)	trichlorfon (DIPTEREX 80 ; CALLIFON)
deltaméthrine (DECIS)	méthomyl (LANNATE, METOVER)	<u>Fongicides :</u>
fenvalérate (SUMICIDIN 10)	parathions (nb spéc)	soufre (nb spéc)

D'après : les actions secondaires des produits phytosanitaires (SPV - UIPP 1983).

#### POMMIER - POIRIER

**CARPOCAPSE - Le 1er vol se poursuit, maintenez la protection**

Lutte aménagée : pensez au 1er contrôle de 1000 fruits.

### TAVELURES - Maintenez la protection jusqu'au 10 Juillet

Nous arrivons bientôt à la fin des risques de contaminations primaires.

Mais attention : les pluies orageuses que nous connaissons depuis le début du mois ont occasionné des sorties de taches récentes, notamment sur fruit. Ces sorties pourraient se poursuivre encore au moins toute la semaine prochaine.

**Observation attentive de vos vergers entre le 10 et le 15 Juillet.**

- En l'absence de taches, la protection pourra être suspendue

- En présence de taches, elle sera maintenue en fonction des risques (pluie, irrigation par dessus) jusqu'à la récolte

**PUCERON VERT NON MIGRANT - Surveillez le haut des arbres**

#### POMMIER

**OIDIUM - Certains vergers sont négligés. Poursuivez partout la protection**